

A 類疾病

対象疾病	予防接種名	接種期間・対象者	回数(間隔)
B型肝炎	B型肝炎ワクチン	生後1歳未満のお子さん	初回：2回(27日以上あける) 追加：1回(第1回目の接種から139日以上あける)
H i b 感染症	ヒブワクチン	生後2ヶ月から5歳未満のお子さん	初回：3回(27日以上あける) 追加：1回(初回接種終了後7月以上あける)
小児の肺炎球菌感染症	小児肺炎球菌ワクチン	生後2ヶ月から5歳未満のお子さん	初回：3回(27日以上あける) 追加：1回(初回接種終了後60日以上あけて1歳以降)
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎(ポリオ)	四種混合ワクチン (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)	第1期 生後3ヶ月から90月までのお子さん	第1期 初回：3回(20日以上あける) 追加：1回(第1期初回接種3回終了後、6ヶ月以上あける)
	二種混合ワクチン (ジフテリア破傷風混合)	第2期 11歳以上13歳未満のお子さん <小学6年生に通知>	第2期 1回
結核	B C G ワクチン	生後5ヶ月から1歳未満のお子さん	1回
ロタウイルス	ロタウイルスワクチン ※令和2年8月1日以降に生まれた方のみ定期接種対象	ロタリックス(1価) 生後6週から24週まで (1回目の接種は生後14週6日までに)	2回(4週間以上あける)
		ロタテック(5価) 生後6週から32週まで (1回目の接種は生後14週6日までに)	3回(4週以上あける)
麻しん 風しん	麻しん風しん混合ワクチン	第1期 満1歳から2歳未満のお子さん	1回
		第2期 満5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間にあるお子さん	1回
風しん	麻しん風しん混合ワクチン	第5期	1回

	又は 風しんワクチン	昭和37(1962)年4月2日から 昭和54(1979)年4月1日の間に生まれた男性 ※風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められた者を除く。	※令和4年(2022)年3月31日まで
水痘	水痘ワクチン	1歳から3歳未満のお子さん	2回(6ヶ月以上あける)
日本脳炎	日本脳炎ワクチン	第1期 生後6ヶ月から生後90月のお子さん (標準:3歳から4歳まで)	2回(6日以上あける)
		第1期追加 生後6ヶ月から生後90月のお子さん (標準:4歳から5歳まで)	1回(第1期初回接種終了後6ヶ月以上あける)
		第2期 ① 9歳以上13歳未満のお子さん ＜小学4年生に通知＞ ② 平成7年(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までの間に生まれた方で接種が完了していない20歳未満の方 ＜高校3年生に通知＞	1回
ヒトパピローマウイルス 感染症	子宮頸がん予防ワクチン	12歳以上16歳未満のお子さん ※川本町では現在積極的な子宮頸がん予防ワクチンの勧奨は差し控えています。しかし、子宮頸がん予防ワクチン予防接種と接種後の副反応との因果関係が否定できないこと及び積極的勧奨の差し控えについての勧告が出されていることを十分理解し、また、子宮頸がん予防ワクチンの予防接種により、持続的な疼痛等の副反応が発生する危険性があることを十分理解したうえでの接種は希望することができます。	サーバリックス(2価) ⇒3回(1月以上の間をあけて2回接種した後、第1回目の接種から5月以上かつ第2回目の注射から2月半以上あける) ガーダシル(4価) ⇒3回(1月以上の間をあけて2回接種した後、第2回目の注射から3月以上あける)