

A 類疾病

対象疾病	予防接種名	接種期間・対象者	回数(間隔)
B型肝炎	B型肝炎ワクチン	生後1歳未満のお子さん	初回：2回(27日以上あける) 追加：1回(第1回目の接種から139日以上あける)
H i b感染症	ヒブワクチン	生後2ヶ月から5歳未満のお子さん	初回：3回(27日以上あける) 追加：1回(初回接種終了後7月以上あける)
小児の肺炎球菌感染症	小児肺炎球菌ワクチン	生後2ヶ月から5歳未満のお子さん	初回：3回(27日以上あける) 追加：1回(初回接種終了後60日以上あけて1歳以降)
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎(ポリオ)	四種混合ワクチン (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)	第1期 生後3ヶ月から90月までのお子さん	第1期 初回：3回(20日以上あける) 追加：1回(第1期初回接種3回終了後、6ヶ月以上あける)
	二種混合ワクチン (ジフテリア破傷風混合)	第2期 11歳以上13歳未満のお子さん <小学6年生に通知>	第2期 1回
結核	B C Gワクチン	生後5ヶ月から1歳未満のお子さん	1回
ロタウイルス	ロタウイルスワクチン	ロタリックス(1価) 生後6週から24週まで (1回目の接種は生後14週6日までに)	2回(4週間以上あける)
		ロタテック(5価) 生後6週から32週まで (1回目の接種は生後14週6日までに)	3回(4週以上あける)
麻しん 風しん	麻しん風しん混合ワクチン	第1期 満1歳から2歳未満のお子さん	1回
		第2期 満5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間にあるお子さん	1回

風しん	麻しん風しん混合ワクチン 又は 風しんワクチン	第5期 昭和37(1962)年4月2日から 昭和54(1979)年4月1日の間に生まれた男性 ※風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められた者を除く。	1回 ※令和7年(2025)年3月31日まで
水痘	水痘ワクチン	1歳から3歳未満のお子さん	2回(6ヶ月以上あける)
日本脳炎	日本脳炎ワクチン	第1期 生後6ヶ月から生後90月のお子さん (標準:3歳から4歳まで)	2回(6日以上あける)
		第1期追加 生後6ヶ月から生後90月のお子さん (標準:4歳から5歳まで)	1回(第1期初回接種終了後6ヶ月以上あける)
		第2期 ① 9歳以上13歳未満のお子さん ＜小学4年生に通知＞ ② 平成7年(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日までの間に生まれた方で接種が完了していない20歳未満の方 ＜高校3年生相当の年齢の方に通知＞	1回
ヒトパピローマウイルス感染症	子宮頸がん予防ワクチン	① 12歳以上16歳未満の女子 ＜中学1年生、高校1年生相当の年齢の方に通知＞ ② 平成9年度～平成17年度に生まれた女性 (ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられたために、接種機会を逃した方) ※令和4年4月1日～令和7年3月31日まで	サーバリックス(2価) ⇒3回(1月以上の間をあけて2回接種した後、第1回目の接種から5月以上かつ第2回目の注射から2月半以上あける) ガーダシル(4価) ⇒3回(1月以上の間をあけて2回接種した後、第2回目の注射から3月以上あける)