

## A 類疾病

| 対象疾病                                | 予防接種名                                   | 接種期間・対象者                                         | 回数(間隔)                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B型肝炎                                | B型肝炎ワクチン                                | 生後1歳未満のお子さん                                      | 初回：2回(27日以上あける)<br>追加：1回(第1回目の接種から139日以上あける)                  |
| H i b 感染症                           | ヒブワクチン                                  | 生後2ヶ月から5歳未満のお子さん                                 | 初回：3回(27日以上あける)<br>追加：1回(初回接種終了後7月以上あける)                      |
| 小児の肺炎球菌感染症                          | 小児肺炎球菌ワクチン                              | 生後2ヶ月から5歳未満のお子さん                                 | 初回：3回(27日以上あける)<br>追加：1回(初回接種終了後60日以上あけて1歳以降)                 |
| ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>急性灰白髄炎(ポリオ) | 四種混合ワクチン<br>(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)   | <b>第1期</b><br>生後3ヶ月から90月までのお子さん                  | <b>第1期</b><br>初回：3回(20日以上あける)<br>追加：1回(第1期初回接種3回終了後、6ヶ月以上あける) |
|                                     | 二種混合ワクチン<br>(ジフテリア破傷風混合)                | <b>第2期</b><br>11歳以上13歳未満のお子さん<br>＜小学6年生に通知＞      | <b>第2期</b><br>1回                                              |
| 結核                                  | B C G ワクチン                              | 生後5ヶ月から1歳未満のお子さん                                 | 1回                                                            |
| ロタウイルス                              | ロタウイルスワクチン<br>※令和2年8月1日以降に生まれた方のみ定期接種対象 | ロタリックス(1価)<br>生後6週から24週まで<br>(1回目の接種は生後14週6日までに) | 2回(4週間以上あける)                                                  |
|                                     |                                         | ロタテック(5価)<br>生後6週から32週まで<br>(1回目の接種は生後14週6日までに)  | 3回(4週以上あける)                                                   |
| 麻しん<br>風しん                          | 麻しん風しん混合ワクチン                            | <b>第1期</b><br>満1歳から2歳未満のお子さん                     | 1回                                                            |
|                                     |                                         | <b>第2期</b><br>満5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間にあるお子さん         | 1回                                                            |
| 風しん                                 | 麻しん風しん混合ワクチン                            | <b>第5期</b>                                       | 1回                                                            |

|                    |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 又は<br>風しんワクチン | 昭和３７（１９６２）年４月２日から<br>昭和５４（１９７９）年４月１日の間に生まれた男性<br>※風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められた者を除く。                                          | ※令和４年（２０２２）年３月３１日まで                                                                                                            |
| 水痘                 | 水痘ワクチン        | １歳から３歳未満のお子さん                                                                                                                                              | ２回（６ヶ月以上あける）                                                                                                                   |
| 日本脳炎               | 日本脳炎ワクチン      | <b>第１期</b><br>生後６ヶ月から生後９０月のお子さん<br>（標準：３歳から４歳まで）                                                                                                           | ２回（６日以上あける）                                                                                                                    |
|                    |               | <b>第１期追加</b><br>生後６ヶ月から生後９０月のお子さん<br>（標準：４歳から５歳まで）                                                                                                         | １回（第１期初回接種終了後６月以上あける）                                                                                                          |
|                    |               | <b>第２期</b><br>① ９歳以上１３歳未満のお子さん<br>＜小学４年生に通知＞<br>② 平成７年（１９９５）年４月２日から平成１９（２００７）年４月１日までの間に生まれた方で接種が完了していない２０歳未満の方<br>＜高校３年生相当の年齢の方に通知＞                        | １回                                                                                                                             |
| ヒトパピローマウイルス<br>感染症 | 子宮頸がん予防ワクチン   | ① １２歳以上１６歳未満の女子<br>＜中学１年生、高校１年生相当の年齢の方に通知＞<br>② 平成９年度～平成１９年度に生まれた女性<br>（ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられたために接種機会を逃した方）<br>※ ②については令和４年４月１日～令和７年３月３１日までに接種した場合のみ対象となります。 | サーバリックス（２価）<br>⇒３回（１月以上の間をあけて２回接種した後、第１回目の接種から５月以上かつ第２回目の注射から２月半以上あける）<br>ガーダシル（４価）<br>⇒３回（１月以上の間をあけて２回接種した後、第２回目の注射から３月以上あける） |